

# もも・ネクタリン特報 ⑥

令和7年6月3日  
JA中野市園芸課  
JA中野市りんご・もも部会

お疲れ様です。5/21の降雹により中野・日野・延徳・平岡（一部地域）で多大な被害が発生しました。被害に見舞われた皆様にはお見舞い申し上げます。

今後は、生産量の確保に向け被害果実の状態を確認し、なるべく軽微な被害果を残しながら作業を進めていただくようお願い致します。

5月末・6月上旬の散布薬剤、栽培管理について  
5/17 配布の特報No.⑤をご確認ください。



## 【もも】 第7回 薬剤散布 ※せん孔細菌病重要防除期間

散布時期	6月中旬 目安：6/12～6/17頃	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ	あたり	
	展着剤（アピオンE）	50ml		
	劇 ① デランフロアブル	166ml	（7日前、4回）	
	劇 ② オリオン水和剤 40	100g	（14日前、2回）	
	マイコシールド	66g	（21日前、5回）	
対象病害虫	せん孔細菌病、黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病 アブラムシ類、モモハモグリガ、カイガラムシ類			
散布量	10a 当たり：500ℓ			

## 【ネクタリン】 第7回 薬剤散布 ※せん孔細菌病重要防除期間

散布時期	6月中旬 目安：6/12～6/17頃	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ	あたり	
	展着剤（アピオンE）	50ml		
	劇 ① デランフロアブル	166ml	（14日前、2回）	
	劇 ② オリオン水和剤 40	100g	（21日前、2回）	
	スターナ水和剤	100g	（7日前、3回）	
対象病害虫	せん孔細菌病、黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病 カイガラムシ類、アブラムシ類、モモハモグリガ			
散布量	10a 当たり：500ℓ			
注意事項	晩生種：せん孔細菌病対策 スターナ水和剤に代えてマイコシールドの1,500倍（28日前、5回）を使用する。			

次回特報配布日  
6月17日（予定）