

シャクヤク特報 No.1

ＪＡ中野市シャクヤク部会
ＪＡ中野市園芸課

「母の日５月 11 日（日）」に合わせる作型の場合、４条無加温ハウスは
3月上旬までに被覆を行い、２条無加温ハウスは早期の出荷を目指し、
3月中～下旬に被覆を行いましょう。

1.ハウスの点検作業 及び 被覆

被覆が古い場合、雪がハウスの屋根から落ちにくく倒壊のリスクが高まります。また、採光率が低くなるため日中の光合成量の不足も懸念されますので、古い被覆を使用している場合はなるべく新しい被覆に張替をお願いします。



3月の雪は水分を含むため施設に負担がかかります。中柱を忘れずに設置しましょう。

2. ハウス栽培の管理

萌芽後から 30℃を超えるような高温管理は奇形花や、葉焼けの要因となりますので小トンネルを設置している場合は特に注意し、日中は換気を行ってください。また、夜間は温度を下げないよう 0～10℃（加温、無加温ともに）の範囲で保温につとめ、なだらかな出荷となるように管理をお願いします。

3. 病虫害防除（ハウス栽培）

回数	月／旬	生 育 期	使 用 薬 剤 と 濃 度	10a当り散布量	対象病虫害
1	3／上	萌 芽 期	オーソサイド水和剤 600 倍 オルトラン水和剤 1,500 倍	100L	立枯病 アブラムシ類、ヨトウムシ類
2	4／上	展 葉 期	ゲッター水和剤 1,000 倍	200L	灰色かび病
3	4／中	展 葉 期	トレノックスフロアブル 500 倍 コルト顆粒水和剤 4,000 倍	300L	灰色かび病 アブラムシ類

4. 除草剤の選択（ハウス及び露地）

圃場の雪が融けてから、地面が湿っていて芽が動いていない状態で除草剤の散布を行いましょう。下記薬剤を同時に散布し、生えている雑草とこれから生える草を抑えましょう。

薬剤名	水量/1a 当たり	薬剤使用量 /1a 当たり	備考
（毒）プリグロックスL	10～15ℓ	100 ml （100 倍）	低温での効果◎ バスタ液剤を代用しても良い。
トレファノサイド乳剤		30 ml （約300 倍）	地面が湿っている時に散布する。 雑草の種子の発芽を抑える効果。 キク科、アブラナ科の雑草には効果劣る。



他薬剤の使用で不明な点については技術員へお問い合わせください。

←左の画像までの生育段階で除草剤の散布を行いましょう。



お問い合わせ
【JA 中野市営農センター】
園芸課
山田：080-6998-0407