

ナシ特報 ⑥

令和7年6月3日

JA中野市園芸課

JA中野市ナシ部会

お疲れ様です。5/21の降雹により中野・日野・延徳・平岡（一部地域）で多大な被害が発生しました。被害に見舞われた皆様にはお見舞い申し上げます。

今後は、生産量の確保に向け被害果実の状態を確認し、なるべく軽微な被害果を残しながら作業を進めていただくようお願い致します。

和 梨【有袋・無袋】共通定期防除

第7回 散布薬剤

散布時期	無袋：6/15～20頃（前回から10日後） 有袋：6/20～25頃（前回から15日後）	散布日	月	日
		散布量		ℓ
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml ベルコートフロアブル 50ml （14日前、5回） エクシレルSE 20ml （前日、3回）			
対象病害虫	黒斑病、黒星病、輪紋病 シンクイムシ類、ケムシ類、アブラムシ類、ハマキムシ類、ヒメボクトウ			
散布量	10a 当たり：450ℓ			
注意事項	①【代替】通常展着剤に代えて、固着性展着剤のアピオンEの2,000倍を使用すると薬液付着効果が高まる。			

和 梨【無袋】定期防除

第8回 散布薬剤

散布時期	無袋：6/25～30頃（前回から10日後）	散布日	月	日
		散布量		ℓ
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml 劇バイスロイドEW 50ml （7日前、2回） ロブドー水和剤 125g （14日前、5回）			
対象病害虫	黒斑病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、アブラムシ類			
散布量	10a 当たり：450ℓ			
注意事項	①【代替】通常展着剤に代えて、固着性展着剤のアピオンEの2,000倍を使用すると薬液付着効果が高まる。			

次回特報配布日

6月17日（予定）

西洋梨【有袋・無袋】定期防除について

次面をご覧ください

西 洋 梨【有袋】 定期防除

第 6 回 6 月下旬散布薬剤

散布時期	6／20～25 頃（前回から 15 日後）		散布日	月	日
散布薬剤	水	1 0 0 ℓ 当たり	散布量	ℓ	
	展着剤（ハイテンパワー）	1 0 ml			
	シトラノフロアブル	1 0 0 ml	（30 日前、3 回）		
	劇ダイアジノン水和剤 34	1 0 0 g	（14 日前、6 回）		
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、コナカイガラムシ				
散布量	10a 当たり：600 ℓ				
注意事項	輪紋病対策 袋掛け前に散布する。また輪紋病感染防止のため、散布後 3 日以内に袋をかける。				

西 洋 梨【無袋】 定期防除

第 6 回 6 月中旬散布薬剤

散布時期	6／10～15 頃（前回から 10 日後）	散布日	月	日
散布薬剤	水 I C ボルドー412	100 ℓ 当たり 3.3 kg	散布量	ℓ
対象病害虫	輪紋病			
散布量	10a 当たり：600 ℓ			
注意事項	【代替】 IC ボルドー412 に代えて、オキシラン水和剤の 500 倍（3 日前、9 回）でもよい。			

第 7 回 6 月下旬散布薬剤

散布時期	6/20～25 頃（前回から 10 日後）	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ 当たり IC ボルドー412 3.3 kg エクシレルSE 20ml（前日、3 回）	散布量	ℓ	
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、アブラムシ類、ケムシ類、ハマキムシ類			
散布量	10a 当たり：600ℓ			
注意事項	【代替】 IC ボルドー412 に代えて、オキシラン水和剤の 500 倍（3 日前、9 回）でもよい。			