



ぶどう特報 #6



2025 年 6 月 2 日
JA 中野市ぶどう部会
JA 中野市園芸課

5 月中旬の夜温が低かったため生育が停滞し、露地の開花は平年並みの見込みです。梅雨期間は黒とう病・晩腐病等の主要病害感染拡大が懸念されます。概ね 10 日間隔で防除を進めてください。また、誘引作業を進め、薬液の通りのよい環境づくりに努めましょう。

年度	巨峰開花	シャイン開花	特記
平年	6/4	6/11	過去 10 年平均値 (H27~R6)
2024 年 (R6)	6/2	6/6	かなり早い生育
2025 年 (R7)	6/6 頃	6/11 頃	夜温が低かったため生育が停滞

品種名：_____
散布日：6 月 ____ 日
散布量：_____ℓ

【6 月中旬の定期散布 *共通】前回から 10 日後

散布時期	落花直後		品種名：_____ 散布日：6 月 ____ 日 散布量：_____ℓ
散布薬剤	水	100 ℓ	品種名：_____ 散布日：6 月 ____ 日 散布量：_____ℓ
	グレースィアフロアブル	25 ml (7 日前・2 回)	
	スイッチ顆粒水和剤	33 g (30 日前・2 回)	
	ゾーベックエニベル顆粒水和剤	133 g (45 日前・2 回) *注意事項①参照	
	グリーンデイズ 等	100 g *葉面散布資材 *注意事項⑤参照	
散布量	400 ℓ / 10a		
適用病害虫	べと病、晩腐病、灰色かび病、 チャノキイロアザミウマ、ブドウサビダニ (ミカンキイロアザミウマ) (コガネムシ類)		
注意事項	① 【注意】ジマンダイセン・ゾーベックエニベル等のマンゼブ成分を含む農薬は、年間の使用回数を 2 回までとする。 ② 【サビ防止対策】落花状況 (花冠の飛び等) を確認して散布する。 ③ 【果粉溶脱防止】展着剤は、今回から第 10 回の防除まで使用しない。 ④ グレースィアフロアブルに代えて㊦コテツフロアブル 2,000 倍 (60 日前・2 回) を使用してもよい。 ⑤ 【果粉溶脱防止】葉面散布剤の混用はブルーム溶脱の恐れがあるため、今回までの混用とする。		

品種名：_____
散布日：6 月 ____ 日
散布量：_____ℓ

【6 月下旬の定期散布 *共通】前回から 10 日後

散布時期	落花 10 日後		品種名：_____ 散布日：6 月 ____ 日 散布量：_____ℓ
散布薬剤	水	100 ℓ	品種名：_____ 散布日：6 月 ____ 日 散布量：_____ℓ
	フェニックスフロアブル	25 ml (14 日前・2 回)	
	トランスフォームフロアブル	50 ml (3 日前・3 回)	
	ジマンダイセン水和剤	100 g (45 日前・2 回) *注意事項①、②参照	
散布量	400 ℓ / 10a		
適用病害虫	べと病、晩腐病、黒とう病、褐斑病、スカシバ類、カイガラムシ類 (アザミウマ類)		
注意事項	① 【注意】ジマンダイセン・ゾーベックエニベル等のマンゼブ成分を含む農薬は、年間の使用回数を 2 回までとする。 ② 【農薬汚れ対策代替】ジマンダイセン水和剤に代えてホライズンドライフロアブル 2,500 倍 (21 日前・3 回) を使用してもよい。 ③ トランスフォームフロアブルに代えて㊦アドマイヤー顆粒水和剤 10,000 倍 (21 日前・2 回) を使用してもよい。		

8 月上旬に露地栽培日誌の配布があるまでは、ぶどう特報などに散布日・散布量を記録し、保管してください。

裏面：シャインマスカット未開花症状について記載しています。

シャインマスカット未開花症状について

例年シャインマスカットの未開花症状が発生しています。
房切り前に以下の点を必ず確認して房切りに取り掛かってください。

1. 未開花の症状について

- (1) 花冠（キャップ）のしわが無いか少ない。（正常な花蕾はピーマンのような形。）
- (2) 開花前になっても緑色が濃い。（正常な花蕾は開花期になると黄緑色に変色する）
- (3) 未開花症状の花蕾は正常なものとは比べ緑色が濃く、丸い（扁平）。
- (4) 房先端の花蕾が房上部と比較して小さい。



未開花の粒

- 花冠のしわが少ない。
- 花蕾が扁平。（イチジク型？饅頭型？）
- 開花前も濃い緑色



正常な房の粒



- 花冠のしわが多い。ぼこぼこしている
- 花蕾が長細い（ピーマン型）
- 開花前は薄緑色。

未開花の有無は展葉 6 枚ごろから確認できます。

2. 対策について

※症状をよく確認した後、房切りを実施する※

- (1) 健全な部分（上部や中間部の支梗）を利用した房切りを実施する。
- (2) 房の先端を利用する場合は房切りを長めにする。



未開花が確認された場合・・・

- ①主穂中間部を使用する。
- ②ショルダーや支梗を使用する。

←切る